

Coquilles terrestres et fluviatiles,
recueillies dans l'Orient par M. le Dr. Alex. Schläfli,
déterminées par

Albert Mousson.

(Suite de la pag. 36.)

Chacune de ces deux routes a fourni deux stations, où M. Schläfli s'est arrêté, Szisa et Sayades d'un côté, Prevesa et Beschpunar (Penta pigadia) de l'autre. Nous excluons cependant la première localité comme faisant plutôt partie du plateau intérieur de l'Épire que de son versant littoral. Sayades et Prevesa sont situés sur le bord même de la mer; Pentapigadia parcontre est placé presque au sommet du versant qui descend vers le golfe d'Arta, près du point culminant de la route qui mène de cette dernière ville à Iannina, à une hauteur de 8—900 mètres. —

1. Zonites hydatinus Rossm.

Recueillie d'abord à Corfou et décrite par M. Rossmäessler (Icon. 1, N° 259, — Bourg. Amén. malac. 1, T. 20, f. 4—6), cette charmante espèce, blanche et brillante, a depuis été retrouvée sur plusieurs points, en Sicile (Schwerzenbach), à Naples (Philippi), en Dalmatie (Parreiss), à Athènes (de Saulcy), à Smirne (Roth). Elle ne paraît pas s'avancer plus au Nord et se présente ainsi comme une forme particulière au sud-est de l'Europe et à la partie de l'Asie-Mineure la plus voisine.

Le seul exemplaire ramassé par M. Schläffi à Prevesa est tout-à-fait typique.

2. Helix aspersa Müll.

Sayades et Prevesa. En ce dernier lieu la plupart des individus, tant fasciés qu'uniformes, ont une tendance à se modifier. Le sommet s'élève en cône, le dernier tour s'abaisse plus qu'ordinairement, l'ouverture devient plus horizontale et s'étend dans un sens oblique. On trouve néanmoins dans le nombre également des échantillons typiques, ce qui prouve que le changement n'est encore qu'individuel et ne s'élève point au degré qui constitue la bonne variété.

3. Helix ambigua Parr.

L'espèce de Corfou et de Céphalonie se retrouve avec toutes ses particularités sur toute la côte de l'Épire, tant à Sayades qu'à Prevesa.

4. Helix carthusiana Müll.

A Sayades, vis-à-vis de Corfou on a la forme typique, à Prevesa domine parcontre exclusivement la variété que M. Parreiss nomme :

Var. claustralis, — paulo gracilior, pellucida, vix albida, apertura transverse subrotundata.

L'ouverture n'est cependant jamais aussi arrondie que dans l'*H. Olivieri* Fer. et la *cantiana* Mont (*carthusiana* Drap), dont elle se distingue en outre par une forme moins renflée et une simple perforation.

5. Helix Olivieri Fer.

De Sayades. Identique avec les échantillons de Corfou. Elle se mêle à la précédente, sans jamais se confondre avec elle.

6. Helix frequens Mss.

T. depresso convexa, anguste perforata, solidiuscula, striata, subpellucida, saturate cornea, nitida. Spira

vix obtusata, regularis. Anfract. 6, regulares, convexiusculi, ultimus vix descendens, rotundatus, unicolor. Apertura rotundato-lunaris, interdum obliqua latior, intus pallide cornea. Perist. rectum, albola-biatum, margine columellari subito breviter reflexo, perforationem semitegente.

Diam. maj. 7. — Min. 6 millim.

Rat. apert. 13 : 12. — Rat. 1 : 3.

Vivant à Prevesa avec l'*H. carthusiana* var. *claustralis*, cette espèce me paraît en différer. La forme est plus élevée et plus régulièrement enroulée, la couleur cornée plus foncée, le peristome fortement labié se colore à peine sur le bord, la perforation est presque cachée par le retour subit du bord columellaire. Le martelage superficiel, qu'on découvre même sans grossissement dans la *carthusiana*, s'efface presque entièrement à côté des stries d'accroissement de la surface luisante.

J'ai reçu cette même forme de M. Friwaldsky du Balkan sous le nom de *H. tecta* Ziegl., lequel, comme on sait, revient à une autre espèce voisine de l'*H. incarnata* M. Sans doute les Malacologues autrichiens l'ont-ils souvent eue sous la main, mais comme ils négligent d'appuyer leur nomenclature de diagnoses suffisantes, il ne m'a pas été possible de la déterminer. Les espèces dont l'*H. frequens* se rapproche le plus au point qu'il est aisé de les confondre, sont: 1) L'*H. consona* Rssm. de la Sicile (Icon. II, N° 572, 573) à laquelle il convient de joindre les *H. convexa* Arad. et *Aenensis* Ben. M. Bourguignat cite l'*H. consona* parmi les coquilles d'Athènes (Catal. p. 23), d'autre part parmi celles de Constantinople (Amen. malac. 1. p. 112); mais je doute de la justesse de cette détermination.

2) *L'H. gilvina* Ziegl. considérée par M. Pfeiffer (Icon. I, p. 133) comme simple variété de *L'H. carthusiana* Müll. Mes exemplaires proviennent également de la Sicile. 3) *L'H. transmutata* Parr., jointe à *L'H. cantiana* Mont. par M. Pfeiffer (Icon. III, p. 118), provenant de l'Asie-Mineure. Je crois posséder ces trois espèces de sources bien authentiques et leur trouve un caractère commun, qui suffit pour les distinguer de notre espèce. Examinées au moyen d'une forte loupe, elles présentent sur les premiers tours de petits points distants, probablement pilifères dans le jeune âge, qui s'étendent plus ou moins en avant vers les derniers tours et ternissent le brillant de la surface; dans notre espèce parcontre le poli reste intact jusqu'au sommet. — *L'H. solitudinis* Bourg. (Catal. p. 23, T. 1, f. 20—22) paraît également voisine, mais elle est plus grande, a des tours moins arrondis, une ouverture plus transverse, une perforation plus large et moins recouverte. Il ne serait cependant pas impossible que toutes deux appartenissent à la même espèce, ce que des observations ultérieures devront décider. Si *L'H. frequens*, dépourvue de caractères bien frappants, ne s'était présentée que comme forme locale, j'aurais hésité à lui donner un nom; mais en la voyant se répandre à travers toute la Turquie et au-delà, s'associer partout avec *L'H. carthusiana*, sans y passer, il m'a paru convenable d'en fixer les caractères et d'en faire ressortir la valeur géographique.

7. *Helix corcyrensis* Partsch.

A Pentapigadia on remonte *L'H. corcyrensis* parfaitement identique avec l'espèce de Corfou, surtout à l'égard de l'absence de toute carène, ce qui est

d'autant plus frappant, que plus loin dans l'Épire la forme typique disparaît.

8. *Helix coreyrensis* Partsch. var. *octogyrata* Mss.

T. major (diam. 14 — altit. 6 m.), supra convexiuscula, summo plano, anfract. 7 1/2 — 8; ultimo rotundato.

Elle diffère donc de la forme typique de Corfou en ce qu'elle est plus grande, un peu moins plate en dessus, pourvue d'un tour de plus; les tours, comme la bouche, sont encore plus arrondis, la surface, à l'état frais, porte également des traces de poils entre les stries costulées de la spire. Cette forme domine aux environs de Prevesa, peut-être coïncide-t-elle avec la var. 8, citée par M. Pfeiffer comme provenant de l'île de Lesina.

9. *Helix coreyrensis* var. *canalifera* Anton.

La forme précédente n'occupe point le littoral vers le Nord. A Sayades apparaît une autre variété, importante à cause de sa grande dispersion, dans laquelle on ne peut méconnaître la vraie *H. canalifera* Anton (Verz. p. 39 et Pfr. Mon. 1. pag. 415). Elle se distingue du type par une spire assez élevée, des tours plus anguleux, sinon faiblement carénés, s'abaissant latéralement un peu en plan incliné, par une ouverture plus étroite, retressie encore par la labiation du bord, lequel est fortement réfléchi et accompagné à l'extérieur d'une rigole — ainsi par un ensemble de caractères bien saisissables. Pourtant nous ne pouvons lui accorder, comme l'ont fait la plus part des auteurs, le titre d'espèce. D'un côté elle se lie intimement à la petite forme, nommée *H. girva* par M. Friwaldsky et *ambliostoma* par M. Parreiss, qui présente les mêmes différences portées seulement à un degré plus exagéré; de l'autre, nous parlerons des

localités où les *H. corcyrensis* et *canalifera* se mêlent par tous les passages intermédiaires, ce qui est le caractère des simples variétés. La relation des *H. corcyrensis* et *lens* Fer à Céfalonie était bien différente.

Outre les noms, que je viens de mentionner, on en cite encore deux, qui se rapportent au même groupe d'Helices et à la même partie de l'Europe, l'*H. lenti-formis* Zglr. et l'*H. barbata* Fer. La première avoisine l'*H. lens*, seulement elle est un peu plus petite, un peu moins déprimée et a sa carène un peu moins tranchante; je crois qu'elle passe insensiblement à la vraie *lens* et je la considère provisoirement comme variété de cette dernière. La seconde a beaucoup embarrassé les Malacologues, par le motif que M. Ferussac (Tab. 66, f. 3 et 4) a évidemment réuni sous ce nom deux espèces fort différentes. La fig. 4 est largement ombiliquée et on l'a tantôt attribuée à l'*H. lens* elle-même (Desh. Expéd. d. la Mor. p. 162), tantôt à l'*H. hispidula* Lam. de Ténériffe; la figure 3 est restée problématique. En l'examinant avec attention on reconnaîtra aisément qu'elle se distingue de toutes les autres par le prolongement insolite du bord basal de l'ouverture jusqu'en avant de l'ombilic, lequel en est en partie recouvert. Ce caractère se présente d'une manière très frappante dans une espèce non carénée et assez velue, que j'ai reçue de deux côtés différents, de M. Parreiss avec la vague étiquette „Grèce“, puis de M. Schwerzenbach, qui l'a trouvée aux monts Spaxiattes dans l'île de Candie. C'est à cette espèce que je crois devoir appliquer le nom de M. Ferussac. Ainsi le groupe méditerranéen de l'*H. corcyrensis* se composera dans ma collection des membres suivants :

- 1) *H. corcyrensis* Partsch.
 - a. *typica*. — Corcyre. Epire (Schläfli).
 - b. *var. cefalonica* Mss. — Céphalonie (Schläfli).
 - c. *var. octogyrata* Mss. — Prévésa (Schläfli).
 - d. *var. canalifera* Anton. — Epire (Schläfli), Rumélie (Schläfli), Budua (Küster), Balkan (Friwaldsky).
 - e. *var. girva* Friw. — Albanie (Schläfli), Balkan (Friwaldsky).
- 2) *H. gyria* Roth. — Cacamo en Carie.
- 3) *H. barbata* Fer. — Grèce? (Parreiss) Candie (Schwerzenbach).
- 4) *H. Tarnieri* Morelet. — Tanger (Morelet).
- 5) *H. lens* Fer.
 - a. *typica* — Morée (Büchi, Hohenacker, Roth), Céphalonie (Schläfli).
 - b. *lentiformis* Zglr. — Thessalie et Attique (Büchi, Bellardi, Parreiss, Schwerzenbach).
- 6) *H. lenticularis* Morelet. — Maroc (Morelet).

10. *Helix subzonata* Mss.

L'espèce du Monte-nero, au premier abord si voisine de l'*Helix zonata* Stud., se retrouve à Pentapigadia entre les rochers. Dans les exemplaires, ramassés à l'état mort et dénués d'épiderme, il n'est plus possible de reconnaître l'existence des poils, et l'analogie avec l'espèce alpine devient, à la moindre convexité près, presque complète.

11. *Helix pisana* Müll.

A Prévésa. Un peu globuleuse, sans particularités.

12. *Helix variegata* Friw.

Nous employons ce nom, sans vouloir nous prononcer sur l'indépendance de cette forme, qui peut-être devra rentrer dans le cercle des nombreuses variétés

de l'*H. striata* Drap (non Müller) ou *profuga* A. Schm. Elle se distingue du type de cette espèce par une spire plus conique, formée de tours moins convexes et à suture peu enfoncée, par l'affaiblissement des stries qui disparaissent presque dans les individus blancs et calcaires, enfin par la coloration, où dominant, sur un fond blanc et non grisâtre, des taches variées et rayonnées à côté des bandes décurrantes. Le terrain de l'*H. variegata* commence à Prévésa et Sayades et se continue, comme on le verra, vers l'intérieur de l'Épire, loin de la mer.

13. *Helix apicina* Lam.

Prévésa. Encore une localité de cette petite espèce bien caractéristique.

14. *Helix conica* Drap.

Egalement de Prévésa. C'est tout-à-fait la forme typique (Rossm. Icon. I, p. 341) à carène bien marquée et à perforation punctiforme.

15. *Bulimus acutus* Müll.

Prévésa. La forme ordinaire, variant, comme on sait, très peu.

16. *Chondrus pupa* Brg.

Prévésa. Grandeur et forme moyenne. A Sayades elle est plus forte; le tubercule et l'épaississement de la lèvre sont développés.

17. *Glandina compressa* Mss.

Elle s'est trouvée aux deux endroits, identique avec l'espèce de Corfou, à laquelle nous pouvons nous référer.

18. *Glandina dilatata* Zglr.

Sayades. La grande différence de cette espèce et de la précédente, malgré leur association en un

même lieu, est peut-être encore plus frappante qu'à Corfou. Toutes deux atteignent de grandes dimensions.

19. Clausilia papillaris Drap.

Elle est très fréquente à Prévésa, un peu moins à Pentapigadia, mais ne présente nulle particularité.

20. Clausilia stigmatica Zglr.

Mêmes lieux. Elle ne diffère des échantillons corfiotes que par une surface moins polie, un peu striée, et une coloration un peu plus foncée.

21. Clausilia senilis Zglr. var. *epirotica* Mss.

T. griseo-alba, concolor, anfractibus convexiusculis.

De Pentapigadia. Les différences d'avec les formes moyennes de Céphalonie sont très faibles et se réduisent à une couleur un peu plus grisâtre et uniforme, et à des tours faiblement convexes.

22. Clausilia inconstans Mss.

T. rimata, subventroso-fusiformis, costulata, non nitens, griseo-alba, concolor. Spira sensim attenuata apice pallide-cornea; sutura subimpressa. Anfract.

11. planiusculi; ultimus irregulariter rugosus, basi rugoso-cristatus, latere compressus, antice per marginem ruga producta incrassatus. Apertura parvula, rotundato-pyrisformis, alba, callo labiali coarctata; lamella supera parvula, infera remota, invalida; plica lunata defecta, palatali unica supera. Perist. solutum, continuum, acutum, vix expansum, intus crasso-labiatum.

Diam. 3,6. — Altit. 15 mm.

Diam. vert. apert. 3,2. — transv. 2,6 mm.

Au premier abord on croit avoir une variété fortement costulée de la *C. senilis* Zglr. sous les yeux. La forme générale et la nature des plis et des lamelles diffèrent à peine. Ce qui la distingue, c'est la forme

de la nuque qui est plus marquée et comprimée et dont part latéralement, — à un moindre degré cependant que dans les *C. strangulata* Fer. et *Zelebori* Rossm. (Icon. III, N° 858, 859), — une forte ride, qui s'élève le long du bord de l'ouverture sur le côté assez comprimé du dernier tour. Cette ride est très inégale, tantôt très forte et relevée, tantôt réduite à un renflement de quelques costules. L'ouverture a ses bords plutôt évasés que réfléchis et se retressit fortement par l'effet d'une forte callosité labiale, qui répond à l'étranglement extérieur qui précède la ride.

Je sépare cette forme remarquable, trouvée entre les rochers de Sayades et qui rappelle certaines espèces de la Syrie, de la *C. senilis*, parce qu'on n'a pas d'exemple qu'une espèce parfaitement régulière puisse se modifier à ce point; mais elle se place à côté d'elle dans le groupe à test calcaire et à lamelles peu développées qui domine en Grèce.

23. Clausilia conspersa Parr.

Un seul exemplaire de Pentapigadia. Il présente les faibles différences de la forme typique indiquées pour les échantillons de Corfou.

24. Cyclostoma elegans Lam.

Tant à Sayades, qu'à Prévésa et Pentapigadia. La forme typique.

25. Pomatias maculatum Drap.

Pentapigadia. Les taches sont peu visibles et la couleur grisâtre; néanmoins je ne saurais placer autrepert cette petite espèce.

En resumé la faune littorale de l'Épire se compose d'éléments assez divers: 1) d'espèces répandues

dans tout le midi de l'Europe (*Hel. aspersa* et *carthusiana*, *Cycl. elegans*); 2) d'espèces qui occupent presque tout le pourtour de la Méditerranée *Hel. pisana*, *apicina*, *conica*, *Bulim. acutus*, *Chondrus pupa*; *Claus. papillaris*; 3) d'espèces qui appartiennent à l'Orient en particulier et surtout aux contrées ioniennes *Zon. hydatinus*, *Hel. ambigua*, *corcyrensis*, *Olivieri*, *Glandina dilatata* et *compressa*, *Claus. stigmatica*; 4) d'espèces qu'on peut regarder comme l'avant-garde de l'intérieur de l'Épire et de l'Albanie (*Hel. frequens*, *canalifera*, *variegata*; enfin 5) il y a l'*Hel. octogyrata* et la *Claus. inconstans* qui se présentent jusqu'ici comme des formes locales.

IV. L'INTÉRIEUR DE L'ÉPIRE.

Au centre du plateau qui forme l'intérieur de l'Épire se trouve le bassin, qu'occupent le lac et la ville de Ianina. Un séjour de deux ans dans cette ville a permis à M. Schläfli de parcourir la contrée dans tous les sens et de réunir une série d'objets que nous osons considérer comme une faune malacologique assez complète de ce point. Nous ajoutons à ce catalogue spécial les objets recueillis sur quelques autres points, faisant toujours partie de l'intérieur des terres et du versant occidental des hautes chaînes, qui séparent l'Albanie de la Macédoine. Ces points sont: 1) Sziza, sur la route qui mène à travers les montagnes à Sayades, 2) Leskowik (Liaskowiki) 13 lieues de chemin au Nord de Ianina, et 3) Gördsche (Goritza) 16 lieues de Leskowik sur le chemin de Monastir.

1. *Vitrina pellucida* Müll.

Je ne puis trouver de différence entre la coquille de Ianina et les échantillons de l'Allemagne. Grâce à sa faculté de se cacher pendant la chaleur et le froid et de ne paraître au jour que par un temps frais et humides, cette petite espèce s'est répandue à travers presque toute l'Europe. Si elle n'est pas plus souvent mentionnée, cela tient à la difficulté de tomber sur le bon moment et le bon endroit.

2. *Zonites glaber* Stud.

Cette coquille, recueillie à Ianina, à Leskowik et, en nombre, sur le sol humide près de la cascade de Calamo à Sziza, diffère un peu de l'espèce qui habite la Savoie, la Suisse et la Lombardie alpine (Rossm. Icon. II, N° 528). La grandeur, la perforation, la surface très brillante, la vapeur lactée au centre de la base, sont assez semblables; les tours parcontre sont sensiblement plus arrondis, le sommet plus abaissé, la base plus convexe. Je la désigne avec M. Parreiss par le nom

»var. *nitidissimus* Parr. — *summo depressiusculo,*
»*anfractibus subrodundatis, subtus convexioribus.*«

On cite le *Z. glaber* de la Hongrie (Strobel), de la Transylvanie (Bielz), de la Carniole (F. Schmidt), de la Dalmatie (Parreiss?), ce qui prouve la grande extension de son domaine vers l'Orient de l'Europe et ce qui sans doute s'explique par les habitudes retirées, sous lesquelles vivent plusieurs Hyalines et qui les préservent des influences climatiques. Ce fait est encore plus frappant pour le *Z. cellarius*, qui se distingue du *glaber* par sa forme plus aplatie et son ombilic plus large.

3. Zonites croaticus Partsch. *var. transiens* Mss.
paulo minor, depressior, fascia cornea destituta, subtus convexior, cornea; radiis latis albidis ornata.

La surface strio-costulée dans un sens et finement striée dans l'autre, la carène blanchâtre peu accusée, l'élévation de la spire, etc.; en somme, la plupart des caractères correspondent à l'espèce de M. Partsch, telle qu'elle est décrite et figurée par M. Rossmäessler (Icon. I, N° 151). Notre variété est pourtant un peu moins grande, de 22 à 24^{mm} seulement, un peu moins élevée, dépourvue de la zone cornée qui longe la carène. La matière calcaire, au lieu d'envahir, comme dans l'espèce typique, presque toute la base d'une teinte blanchâtre, se réduit à quelques larges rayons, ou bien disparaît entièrement pour faire place à une couleur cornée uniforme.

Entre l'Épire, où cette coquille s'est trouvée sur les rochers humides à Sziza et la patrie de la vraie *croatica* se rencontre dans le Montenegro la variété que M. Parreiss envoie comme *Z. pudiosus* Zglr. Récemment M. Ad. Schmidt (Pfr. Mon. IV, p. 119) a détaché de l'espèce, telle que l'avait conçue M. Rossmäessler, une forme plus petite, plus déprimée, plus fortement carénée, habitant la Carniole, qu'il a nommée *Zonites carniolicus*. Des recherches plus complètes sur les rapports géographiques de ces diverses formes, soit entr'elles, soit avec les espèces voisines (les *Z. albanicus* et *compressus* Zglr, le *Z. acies* Partsch, etc., Rossm. I, N° 148–152), dont chacune développe en outre ses propres variétés, seraient d'un grand intérêt; car on ignore pour plusieurs de ces formes si l'on ose les considérer comme de bonnes espèces, capable de coexister en un même lieu sans se mêler, ou s'il

y a substitution et exclusion, ce qui laisse indécise la question de l'espèce ou de la variété.

4. *Zonites hydatinus* Rossm.

Elle s'est trouvée sous les pierres près du château de Ianina.

5. *Helix Schläflii* Mss.

T. obtecte-perforata, ventroso-globosa, irregulariter rugoso-striata, lineis impressis interruptis seu continuis decussata, luteo-albida, fasciis quinque, interdum junctis vel deficientibus, fusco-griseis ornata. Spira depresso-conoidea; summo albo, nitido, crassiusculo; sutura subirregulari. Anfract. 4½, convexiusculi, rapide accrescentes; medii spiraliter lineati; ultimus ventrosus, vix subdescendens. Apertura ampla, oblique lunato-rodundata, intus griseo-alba, fasciis perspicuis, ad marginem insertionis et in apertura pariete fusco-grisea. Perist. intus late sublabiatum, marginibus remotis; dextro simplice, columellari subobliquo, late reflexo, perforationem fere occultante, fusco-griseo.

Diam. maj. 50; min. 38; altit. 47 min.

Rat. anfr. 1 : 2. — Rat. 11 : 9.

Cette espèce, trouvée en grandes dimensions à Ianina et un peu plus petite à Sziza, appartient au groupe de l'*H. pomatia* Linn., mais ne s'accorde ni avec l'espèce typique, ni avec l'*H. tigata* auct. (Rossm. N° 289), ni entièrement avec l'*H. Buchi* Dub. (Pfr. Mon. III, p. 181 et Chemn. Ed. II, T. 148, f. 6, 7), provenant de la Transcaucasie russe. Elle est moins élevée, transversalement plus renflée que la première, ce qui la rapproche le plus de la troisième; sa perforation est presque entièrement recouverte par le bord columellaire, comme dans l'*H.*

Buchi et plus que dans l'*H. pomatia*; la calumelle n'est pas grêle, enfoncée et excavée comme dans l'*H. ligata*, mais, ainsi que la paroi aperturale, colorée de la même manière en brun, — caractère qui manque à l'espèce caucasienne; l'ouverture est plus transversale que dans les *pomatia* et *ligata*, pas autant que dans la *Buchi* et l'*H. lucorum* Müll.; la surface est assez rude, irrégulièrement striée et croisée par des impressions et lignes spirales très interrompues, visibles surtout sur les tours moyens, caractère qui dans les autres espèces n'est pas aussi marqué; le nucleus enfin est blanc et un peu renflé ou informe. En définitive il faudra placer cette forme, que nous isolons, faute de savoir la caser autre part, entre les trois espèces, que je viens de nommer, toutefois en la rapprochant le plus de l'*H. Buchi*. Elle diffère essentiellement de l'*H. ambigua* Parr. du littoral, ainsi que de l'espèce suivante.

Pendant les longs jeûnes de l'Eglise grecque, au printemps, il est fait à Ianina une grande consommation de l'*H. Schläflii*, qu'on apporte en masse des villages du voisinage. On la nomme dans le dialecte épirotique *Saliangos*, mot qui signifie en général „escargot“, mais qui s'emploie surtout pour désigner l'espèce présente.

6. *Helix lucorum* Lin.

J'admets pour cette espèce l'interprétation qu'en a donné M. Rossmäessler (Icon. I, N° 291) en l'identifiant avec l'*H. mutata* Lam. (Anim. s. vest. ed. Dh. p. 30). Dans l'Epire elle paraît manquer, mais vers l'Albanie, proprement dite, M. Schläfli l'a rencontrée à Gördsche, avec tous ses caractères bien connus, sa coquille en même temps globuleuse et transverse, sa couleur brune, avec deux bandes blanches l'une le long de la suture, l'autre au pourtour de la co-

quille, son ouverture un peu déprimée, à calumelle rectiligne et fortement colorée, etc.

7. *Helix subzonata* Mss.

On rencontre cette espèce, probablement la seule Campylée, en quantité, sur le sol rocheux de tout l'Épire, p. ex. à Ianina et à Sziza. Les caractères qui la séparent de la *H. zonata* des alpes, savoir la forme moins convexe et la présence des poils ou de leurs marques, qui à la vérité disparaissent dans les exemplaires pelés et usés, persistent avec constance. Je ne doute pas que l'espèce de Corinthe, que M. Bourguignat détermine comme var. de l'*H. zonata* Stud. (Cat. p. 20) soit la même espèce, malgré l'absence de la bande et des points pilifères, qui dans l'exemple unique rapporté par M. de Saulcy paraissent avoir disparus. A la vérité je ne sais comment comprendre la phrase „marginè columellari in umbilico immerso“, si du moins l'échantillon étoit adulte.

8. *Helix coreyrensis* Partsch. var. *canalifera* Ant. et *girva* Friw.

A Ianina on rencontre la même forme comme à Sayades, souvent munie d'une callosité qui rejoint les deux bords; mais elle se mêle à d'autres échantillons, dont l'ouverture se rétrécit par l'épaississement de la labiation et qui se rapprochent entièrement de la var. *girva* Friw., que nous avons déjà citée. L'angle de la carène répond à la forme de l'ouverture et devient plus marqué quand celle-ci se rétrécit. La fusion des deux formes par tous les passages intermédiaires est ici manifeste.

Plus au Nord la var. *girva* paraît exclusivement dominer.

9. Helix pulchella Müll.

Entièrement lisse ou légèrement striée; du reste parfaitement typique. A Ianina, comme partout ailleurs, elle se cache dans la mousse sous les pierres.

10. Helix carthusiana Müll. (non Drap.).

A Ianina, à Sziza, à Leskowik: partout en quantité et de grandeur moyenne ou petite.

11. Helix frequens Mss.

De Leskowik quelques échantillons isolés.

12. Helix sericea Drap.

De Ianina M. Schläfli a envoyé une petite espèce, cornéo-claire ou rose-cornée, mince, perforée; toute la surface est couverte non de poils visibles, mais de petits points assez serrés qui trahissent l'existence ou les conditions d'existence de production piliformes. Je ne puis y reconnaître qu'une des nombreuses variétés de l'*H. sericea*, difficile à bien diagnostiquer

var. *epirotica* Mss. — *pallide vel roseo-carnea, pellucida, tenuis, epidermide fugace, punctis confertis minutis, non pilosis, ornata.*

13. Helix variegata Friw.

Cette espèce, que nous avons déjà mentionnée pour le littoral, pullule aux environs de Ianina, tantôt de couleur blanche, tantôt agréablement ornée de bandes interrompues sur des lignes rayonnantes. M. Bourguignat dans ses deux catalogues de coquilles orientales (Amén. I, p. 120 et Catal. p. 29) indique comme très répandue en Grèce, aux environs de Constantinople et de Varna l'*H. maritima* Drap. Ne serait-ce pas l'espèce de M. Friwaldsky, qu'il a eu en vue? A la vérité celle-ci diffère de la *maritima* par sa grandeur, par le peu de convexité de ses tours à l'endroit de la spire, par la nature de la coloration, du moins

en la comparant à la forme typique du Midi de la France; parcontre elle se rapproche beaucoup de certaines formes de l'Algérie, de Bona p. ex., que les malacologues français subordonnent comme variété à l'*H. maritima*.

14. *Helix ericetorum* Müll.

Les pentes arides et exposées aux environs de Ianina et de Sziza sont peuplées par une coquille surbaissée à tours assez cylindriques, très largement ombiliquée, ordinairement inégalement blanche ou fasciée en dessous de 5 à 6 bandes brunes interrompues. On ne peut la ranger que sous l'espèce de Müller, dont elle diffère cependant à quelques égards.

var. vulgarissima Schfl. — *T. tota alba, nebulosa* vel *infra interrupte fusco-fasciata, anfractibus irregulariter teretibus; ultima lente descendente* Diam. 17, altit. 9 mm.

L'espèce bien connue de Müller est au contraire très régulièrement enroulée, non descendante et ornée de lignes entières d'un gris violet. Probablement que l'un des noms *trochlearis, obvia, derbentina* Andrz. (Pfr. Mon. I, p. 163) s'applique à notre variété, mais faute d'échantillons authentiques j'emploie celui que M. Schläfli a proposé. Les jeunes exemplaires recueillis à Sziza, fasciés en dessous, et à tours un peu aplatis en dessus, ressemblent à l'*H. obvia* Hartm. (Gaster. I, p. 148, T. 45 et Pfr. Mon. I, p. 162), car c'est surtout le dernier tour qui détermine la largeur de l'ombilic. A Leskowik la couleur lactée, accompagnée d'un certain poli, rappelle l'*H. candicans* Zglr. (Pfr. Icon. I, p.) de la Lombardie; l'ombilic toutefois est plus large et l'accroissement des tours plus lent. La Turquie, les provinces du Danube, la Russie méridionale présentent

au reste une grande variété de formes, oscillant entre les espèces que nous venons de citer, et qui embarrassent beaucoup le collecteur. Il faut ou les réunir sous un même type, remarquable par sa grande variabilité, ou bien avouer avec franchise que les caractères du test ne suffisent plus dans ce cas à décider de l'espèce.

15. *Bulimus detritus* Müll. var. *tumidus* Parr.

M. Schläfli ne l'a envoyé ni de Ianina, ni de Sziza; mais bien des deux autres localités plus au nord, Leskowik et Gordsche. Dans toutes les deux ce n'est pas la forme typique de la France et de l'Allemagne, mais bien la variété plus ramassée et glandiforme, qui en plus grandes dimensions se trouve dans l'Asie-Mineure et a été nommée *B. tumidus* par M. Parreiss. Comme le type, elle est tantôt blanche, tantôt flammulée en brun.

16. *Chondrus pupa* Lin.

Malgré l'éloignement de la côte on rencontre cette espèce en quantité aux environs de Ianina. Elle est parfaitement typique, quoique plus petite que sur les îles ioniennes.

17. *Glandina compressa* Mss.

Entre les rochers à Ianina. Les individus adultes sont assez rares et n'atteignent pas la grandeur de ceux de Corfou.

18. *Glandina dilatata* Zglr.

Sziza est le dernier point où M. Schläfli a rencontré cette grande et belle espèce.

19. *Succinea angusta* F. Schm.

Cette espèce trouvée au bord du lac de Ianina, est plus enroulée que la *S. Pfeifferi* Rssm. (Icon. I, N^o 46), la spire ne formant que la sixième partie du

dernier tour. M. F. Schmidt proposa ce nom pour des exemplaires de l'Istrie, avec lesquels ceux de Ianina coïncident parfaitement. J'ai reçu cette même forme svelte et comprimée dans le haut des tours, de la Grèce et de la Sicile; elle paraît donc essentiellement appartenir au midi, et je n'aurais pas hésité de lui donner le nom plus ancien de *S. levantina* Desh., si la plupart des Malacologues (Pfr. Mon. II, p. 515), et récemment encore M. Bourguignat (Catal. p. 6) n'avaient pas déclaré ce nom être synonyme de celui de *Pfeifferi*.

20. Pupa Philippii Cantr. var. *exigua* Mss.

De Ianina. C'est la même forme dont nous avons fait mention dans l'article sur Corfou.

21. Pupa avena Drap.

Voilà une seconde Pupa, laquelle manque aux îles ioniennes et qui n'a pas de rapport avec la précédente. C'est au reste entièrement l'espèce si bien connue de l'Europe moyenne, garnissant par milliers les rochers calcaires; seulement sa teinte tire plus sur le brun, que sur le chocolat. M. Schläfli l'a recueillie en quantité, tant à Ianina qu'à Leskowik. Son apparition dans l'Épire mérite d'être notée, attendu qu'elle est remplacée dans une partie de la Dalmatie et de l'Istrie par la *P. hordeum* Rssm. (non Studer) (Icon. I, p. 320), qu'on reconnaît à sa forme conique et ses tours convexes.

22. Pupa minutissima Hartm. var. *obscura* Mss.

T. eleganter striata, epidermide obscura, permanente vestita, anfractibus 6, spira de tertio cylindrica; margine vix reflexiusculo, obscuro; apertura edentula.

Elle s'est trouvée à Ianina sous la mousse, associée à l'*H. pulchella* Müll., sa compagne ordinaire.

Les différences de la forme typique consistent dans la permanence d'une épiderme brun-foncée, matte, masquant les stries costulées, en un sommet encore plus obtus, ne commençant à s'atténuer qu'au quatrième tour à partir de l'ouverture, enfin en une ouverture sans trace de dents, et un bord peu épaissi et foncé. Il me semble que ces caractères ne sont pas suffisants pour justifier l'établissement d'une nouvelle espèce.

23. *Clausilia stigmatica* Ziegl.

Des trois espèces de Clausilies qu'on rencontre encore à Pentapigadia la première, la *C. papillaris* Drap. ne semble pas quitter le versant de la côte et, comme autre part, se tenir essentiellement au voisinage de la mer. La seconde, la *C. stigmatica* Zglr., si fréquente à Corfou et à Prévésa, devient extrêmement rare aux environs de Ianina; M. Schläfli n'en a découvert qu'un seul échantillon dans la mousse d'un tronc de chêne, à 1½ lieue de la ville. Cette espèce paraît moins liée à la proximité de la mer, qu'à la présence d'une certaine humidité dans l'air et d'un sol couvert de végétations, deux conditions que le terrain aride de Ianina ne présente pas.

24. *Clausilia senilis* Zglr. var. *epirotica* Mss.

La troisième espèce de Pentapigadia, aimant les rochers exposés, se trouve parcontre en quantité aux environs de Ianina. Elle a tous les caractères de la variété de Pentapigadia, à l'exception d'une taille en moyenne plus petite. Elle s'associe alors avec les espèces suivantes, dont trois sont particulières à l'Épire.

25. *Clausilia conspersa* Parr.

Ianina est la vraie patrie de la *C. conspersa*; au lieu d'y être rare, comme à Corfou et sur le littoral,

elle peuple par millier les murs et rochers du château. Dans une localité elle atteint une longueur de 20^{mm} sur 5 d'épaisseur et développe un bord labié d'un millimètre de largeur. La surface foncée, finement striée et ornée le long de la suture de stigmates, qui ne sont point des papilles, mais une coloration blanchâtre des stries, lui donne un aspect fort élégant. Elle se trouve également à Leskowik.

26. *Clausilia vallata* Mss.

T. rimata, ventroso-fusifformis, vix diaphana, striatula sine nitore, griseo vel pallide cornea. Spira summo subattenuato, obtusiusculo; sutura non impressa, minute, versus summum distinctius papillata. Anfr. 9½ primi convexi striati et papillati; sequentes plani, suberenulati, ultimus sine papillis costulato-striatus, latere vix depressiusculus, praeditus ruga acuta alba, de rima per cervicem et latus ad suturam ascendente. Apertura oblique pyriformis; lamellis parvulis, infera profunda et depressa; lunella distincta, extus conspicua; suturam attingente; plicis palatalibus nullis, columellari, torta, vix emersa. Perist. vix continuum, non solutum, appressum, expansum, intus labio latissimo albo, aperturam percoarctante productum; margine reflexiusculo.

Long. 19—20, diam. 4 mm.

Apert. altit. 3,8, latit. 3,2 mm.

Une belle espèce, qui se place à côté de l'espèce Croate *C. vibex* Rssm. (Icon. I, N° 629), mais qui en diffère par les nombreux caractères indiqués dans la diagnose, par la grandeur, la restriction des papilles aux tours supérieurs, la crête aigüe qui orne la nuque et le flanc du dernier tour, la forme allongée de l'ouverture, la prolongation de la lunule jusqu'à la suture,

l'absence de tout pli, excepté le columellaire, la labiation extraordinaire et peu enfoncée, etc. Elle se trouve en grand nombre sous les pierres aux environs de Ianina.

27. Clausilia rugilabris Mss.

T. rimata, ventroso-subfusiformis, glabriuscula, pelucida, striatula. Spira, summo subattenuato, obtusiusculo; sutura tenui albida. Anfractus 11, superi convexi, fusco-cornei; sequentes planiusculi, ultimus subinflatus, fortiter striatus, cervice late rotundata. Apertura rotundato-quadrata, magna; lamella supera emergente, perspicua; infera remota, depressa, undulata; lunella maculiformi, plicam secundam palatalem, minorem, non superante; plicis 4 perspicuis, prima suturæ parallela, secunda breviori, lunella exeunte, tertia punctiformi remota, columellari vix emergente. Perist. interruptum, late reflexum, limbo albo incrassato, inæqualiter rugoso, ad canalem superam subdentato præditum.

Long. 21. — latit. 4,5 mm.

Apert. altid. 4,8; latit. 4 mm.

Une seconde nouvelle espèce, qui à Ianina est extrêmement fréquente, se trouvant partout entre les pierres et les rochers. Au premier abord elle rappelle le groupe dalmate qui contient les *C. cattaroensis* Ziegl., la *lavissima* Ziegl. avec sa variété la *C. superstructa* Parr., la *pachystoma* Küst., etc. (Rossm. Icon. I, N° 100. II, N° 716, 717. — Pfr. Mon. II, p. 431, 433. III, p. 604). Mais la première est bien plus cylindrique, elle a ses lamelles et la lunelle plus développées, ses second et troisième plis allongés et visibles, son bord peu épaissi. Les trois autres espèces n'ont qu'un seul pli pariétal, allongé et visible et une

lunelle étendue à partir de ce pli unique. Le groupe des *C. bilabiata* Wagn. et *crassilabris* Müll. (Pfr. II, p. 450) n'a d'autre analogie que l'épaisseur du bord. La forme et le bord de l'ouverture, la forme de la coquille, surtout celle du dernier tour ressemblent aussi à la *C. contaminata* Ziegl. de Céphalonie, mais cette dernière est opaque, bleu-lactée, elle n'a que de très faibles lamelles, qu'un seul pli pariétal, etc. La *rugilabris* se place en définitive entre la *contaminata* et la *cattaroensis*.

28. *Clausilla janinensis* Mss.

T. rimato-perforata, cylindraceo-fusifformis, sublaevigata, diaphana, pallide cornea. Spira sensim attenuata; apice saturate corneo; sutura subimpressa, albido-filosa. Anfractus 12; primi convexi striati, nitidi; medii planiusculi; ultimus pallidus, secundum suturam inflatus, medio subimpressus, cervice obtusobituberculata. Apertura semiovalis, subinterrupta; lamella supera compressa, protracta, infera profunda, invalida; plica supera elongata, perspicua; secunda imperfecta breviori; tertia infera punctiformi; lunella distincta, plicæ superæ juncta. Perist. expansiusculum, non solutum, vix tenuiter labiatum; marginibus subparallelis, remotis, callo tenui junctis.

Longit. 17. — Latit. 3 mm.

Apert. altit. 3; latit. 2,8 mm.

Cette troisième espèce, tout aussi fréquente aux environs de Ianina que les précédentes, se rapproche encore plus de la *Cl. cattaroensis*. La petitesse, la forme plus élancée, la couleur pâle des derniers tours, le faible développement des plis, surtout du second et du troisième, la petitesse de la lamelle inférieure, la striature de la surface, enfin la forme du dernier

tour suffisent, je pense, pour démontrer son indépendance de cette espèce, aussi bien que des autres nombreuses espèces de la Dalmatie auxquelles on serait tenté de la comparer.

29. Cyclostoma elegans Lam.

Très fréquent à Ianina et à Sziza, toujours à l'état normal.

30. Pomatias excisus Mss.

T. imperforata, conico-turrita, tenuiscula, subdiaphana, pallide griseo-cornea, unicolor vel leviter biseriatis luteo-maculata, argute albido-costulata. Spira sursum conica; summo acutiusculo; sutura regulari. Anfract. 8—9, convexi; primi laevigati, fere vitrei; medii fortiter costulati, ultimus subteres, costulis minoribus arctioribusque praeditus. Apertura verticalis, suburcularis. Perist. duplex; internum continuum, appressum, in perforationis loco reflexum et eam obtegens; externum concavo-dilatatum, extus albidum, biauriculatum, auricula supera fere adnata, infera spatio exciso lato separata. — Operculum normale.

Altit. 10; diam. 4 mm.

Aper. diam. int. 2,2; — ext. 3,4 mm.

Cette espèce, qui provient de Ianina, ne peut être comparée qu'aux *P. auritus* Ziegl. (Rssm. I, N° 398. — Pfr. Mon. Pneum. I, p. 297) et *P. tessellatus* Wieg. (Rssm. I, N° 404. — Pfr. I, p. 299). Mais elle est plus élancée que toutes les deux, presque autant que le *P. patulus* Drap.; elle n'a pas leur test cendré et opaque, possède un ou deux tours de plus et se distingue enfin par la grandeur de l'intervalle, qui sépare l'oreillette gauche du bord largement réfléchi de la surface de l'avant-dernier tour. La perforation manque

entièrement. De plus, la surface est plus finement costulée que dans le *tesselatus* et plus également que dans l'*auritus*, auxquels cependant elle se lie en un même groupe, caractérisé par un double bord largement réfléchi et biauriculé, lequel manque au groupe français du *P. obscurus* Drap. et *carthusianus* Dupuy (*apricus* Mss.).

31. *Limnæus stagnalis* Müll.

Se trouve en quantité dans le lac de Ianina. La forme, l'élévation de la spire, la convexité des tours, les dimensions tiennent à-pen-près la moyenne entre les extrêmes; la coloration est parcontre d'un corné plus foncé qu'à l'ordinaire.

32. *Limnæus vulgaris* C. Pfr.

De petits échantillons, provenant du lac de Ianina, qui ressemblent parfaitement à des individus non adultes du *L. vulgaris* (C. Pfr. I, p. 89, T. I, f. 22 et Rossm. Icon. I, N° 53), auquel il faut adjoindre le *L. tener* Parr. de l'Orient.

33. *Planorbis etruscus* Ziegl.

On considère souvent ce Planorbe comme une simple variété du *P. corneus* Drap., mais la constance de ses caractères, savoir les tours renflés et moins nombreux, ainsi que la limitation de son apparition aux contrées méridionales de l'Europe, lui assurent une certaine indépendance. Les échantillons du lac de Ianina, où cette espèce se rencontre en quantité, offrent de grandes dimensions, 39^{mm} de diamètre sur 15^{mm} de hauteur; ils ont une couleur foncée sur le pourtour, jaunâtre vers le centre et blanchâtre à la base; les tours sont au nombre de 5, mais croissent si rapidement que les trois derniers restent seuls visibles; les trois premiers sont couverts de stries

décurrentes qui, au reste, existent également dans le *P. corneus* typique, quoique peu d'auteurs n'en fassent mention; les derniers portent souvent les impressions decurrentes, bien connues dans plusieurs espèces lacustres.

34. Planorbis marginatus Drap.

35. Planorbis carinatus Müll.

Ces deux espèces, habitant si souvent les mêmes eaux sans se confondre, se trouvent également associées dans le lac de Ianina. Elles présentent toutes les deux tellement les caractères typiques, qu'il serait impossible de les distinguer des échantillons de l'Allemagne ou de la Suisse.

36. Planorbis janinensis Mss.

T. valde depressa, utrinque fere aequaliter concava, tenera, diaphana, pallide cornea, subtiliter striata, lineis spiralibus destituta. Anfractus 4 celeriter accrescentes, depressi, subcarinati; ultimus subtus paulo convexior, acute angulatus. Apertura obliqua, transverse depresso-elliptico; margine recto, acuto, non labiato, nec marginato, insertionibus lamina tenui disjunctis.

Diam. maj. 4,6; min. 3,4; altit. 1,2 mm.

Diam. transv. apert. 2,1; altero 1,8 mm.

Ce petit Planorbe, fréquent à Ianina m'a assez intrigué avant de pouvoir me décider à lui donner un nom. Vu du côté des faces, la grandeur et l'enroulement des tours rappellent beaucoup le *P. albus* M. ou *hispidus* Drap.; mais sur un grand nombre d'individus que j'ai examinés à la loupe, pas un seul n'a présenté la moindre trace des stries décurrentes de ce dernier. En outre il se distingue de suite de cette espèce comme des autres qui l'avoisinent, savoir le *P. laevis* Alder

(Moquin-Tandon. hist. II, p. 442, T. 31, f. 20—23 et Rssm. Icon. III, N° 964), le *P. cornu* Ehrenb. (Rssm. III, N° 963) et *Rossmuessleri* Auersw. (Rossm. III, N° 962) par la forte dépression des tours, qui supérieurement sont un peu plus aplatis qu'à la base et se terminent au pourtour par un angle assez aigu, ou une carène un peu arrondie.

37. *Ancylus radiolatus* Küst.

Cette espèce distincte de l'*A. fluviatilis* Dr. par son sommet moins élevé et moins marginal, et sa costulation élégante, qui part d'un crochet violet ou bleuâtre, paraît assez répandue dans une certaine zone méridionale de l'Europe. Je la possède de la Sardaigne (Küster), de la Corse (Blauner et Menzel), de la Sicile (Schwerzenbach), maintenant de Ianina (Schläfli). M. Villa l'a nommée *A. costatus*.

38. *Bythinia similis* Drap.

Il y a dans le lac de Ianina deux variétés, une petite de 5^{mm} et une grande, la *B. Troscheli* Charp., de 11^{mm} qui ne diffèrent que par la grandeur, mais nullement par la forme, et que les auteurs détermineraient toutes deux comme *similis* Drap. Elles sont toutes deux un peu plus élancées que les échantillons de Berlin et du nord de l'Allemagne; leur ouverture par suite est un peu plus allongée, mais on ne peut se méprendre sur l'espèce. Au reste M. Roth l'a également recueillie dans l'Attique.

39. *Paludina inflata* Villa.

Sans m'occuper de la question, si cette forme remarquable de la Briança est indépendante ou liée comme variété à la *P. vivipara* Drap.; il me paraît fort intéressant de la voir reparaître, avec tous les caractères essentiels qu'indique M. Villa (Dispos. syst. 1841,

p. 60) et avec des dimensions tout aussi gigantesques (60^{mm} sur 40), en une seconde localité, le lac de Ianina. Il y a cependant quelques faibles différences:
Var. janinensis Mss., — *T. striata, griseo-cornea*; perforatione angusta, semitecta; anfractibus minus convexis; spira paulo elatiore, summo corroso, obtuso.

La coquille est un peu plus élevée, ses tours sont un peu moins arrondis que dans la forme du lac de Pusiano, sans se rapprocher pourtant de la *P. fasciata* Müll. (*achatina* Drap.); l'ombilic surtout est plus étroit et presque caché par la réflexion du bord columellaire. Le sommet, toujours corrodé dans les vieux individus, est par ce motif obtus et non mucroné; la surface sous une pellicule végétale est assez fortement striée et moins foncée que dans le type.

Jusqu'ici M. Schläfli n'a envoyé ni Paludinelles, ni Neritines de Ianina, deux genres, dont abondent ordinairement les contrées de l'Orient.

40. *Valvata piscinalis* Müll.

Du Lac de Ianina. C'est la forme typique, la plus fréquente dans la France et le nord de l'Allemagne, intermédiaire entre la variété plus turriculée des lacs de la Suisse et la *V. depressa* C. Pfr. des eaux courantes.

41. *Cyclas cornea* Lin.

Cette espèce, la *C. rivalis* Drap., est une des plus répandues. Elle se trouve dans toute la France et l'Allemagne, l'Italie boréale, la Russie méridionale, etc.; il n'est donc pas étonnant de la retrouver dans l'Épire, aux environs de Ianina. C'est au reste la variété peu bombée qui par son contour général se rapproche un peu de la *C. lacustris* Müll. (*caliculata*

Drap.), tout en différant de cette espèce par ses crochets peu apparents et la curvatura du bord cardinal.

42. *Anadonta cellensis* Schröt.

Du lac de Ianina. Cette forme rentre entièrement dans les dimensions et le cercle des variétés de l'*A. cellensis*, quoiqu'elle soit un peu moins large et plus bombée que la figure de M. Rossmassler (Icon. I, N° 280). Les plus grands échantillons ont 13,5 cm. de longueur sur 6,3 cm. de largeur et 4,0 cm. d'épaisseur de valve à valve. Comme toujours les jeunes individus sont comparativement plus larges et se rapprochent par là de l'*A. piscinalis* Nilss.

43. *Dreissena polymorpha* Pallas.

Le lac de Ianina est rempli de cette curieuse bivalve qui au moyen de son bissus s'attache en grappes de nombreux individus aux objets les plus divers. La présence dans l'intérieur des terres est un fait remarquable sur lequel les naturalistes ne sont pas encore d'accord; les uns la considèrent comme l'effet d'une introduction venant du dehors, les autres comme la preuve d'une origine indigène, dans les lieux mêmes où on l'observe. Je pense que chacune de ces opinions a son côté de vérité. D'abord il est prouvé que les Dreissenes ont de temps historiques envahi divers ports et progressivement remonté certains cours d'eau, où jadis on ne les connaissait pas. Mais si ce fait s'explique très naturellement par la faculté exceptionnelle de cette bivalve de prospérer aussi bien dans les eaux salées que dans l'eau douce et par sa disposition à voyager, en se fixant à la coque des bâtiments, il n'en est plus ainsi lorsqu'il s'agit de localités qui ne sont pas en communication avec la mer et que nul bateau ne saurait atteindre.

Tel est le cas du lac de Ianina et de quelques autres dans l'intérieur de l'Épire et de la Rumélie, éloignés qu'ils sont de la côte et n'ayant aucun écoulement apparent vers la mer. Comment une migration quelconque aurait-elle pu avoir lieu? Si l'on accorde, pour faire la part des circonstances fortuites et accidentelles, la possibilité que les Dreissenes aient pu s'insinuer dans l'un de ces lacs, leur présence dans *plusieurs* d'entr'eux, en dépit de leur distance et de leur indépendance mutuelle, sera bien difficile à concevoir et milite certainement en faveur d'une origine indigène. Mais le fait le plus concluant me paraît être la différence spécifique qui existe entre les formes de différentes contrées assez voisines, différences qui, certes, ne pourraient subsister, si la diffusion ne s'était opérée que par transport ou migration. Je citerai comme exemple l'espèce qu'a rapportée M. de Schwerzenbach de certains lacs dans l'intérieur de l'Asie-Mineure et qui ne peut être réunie à la *D. polymorpha*. En définitive je pense que cette dernière espèce est indigène dans la Turquie, les provinces du Danube, où on la rencontre jusqu'en Hongrie et dans la Russie méridionale, tandis que sa présence dans le Nord de l'Europe, en Hollande, dans le Danemark et dans les fleuves de la Baltique serait due à un transport du dehors, qui n'a pu atteindre les bassins intérieurs trop isolés ou trop éloignés de la mer.

V. LA BULGARIE.

Pour arriver à Ianina M. Schläfli traversa, à partir de Varna sur la mer noire, toute la Bulgarie et

la haute Macédoine. Ce voyage, long et pénible, fait à cheval à la suite du régiment, sans autre repos que quelques heures de bivouac, et sous l'assujettissement du service, ne lui laissait que bien peu de temps à vouer aux études d'histoire naturelle. Aussi les objets provenant de ce voyage sont-ils en petit nombre et proviennent-ils de points assez espacés le long de la route. Néanmoins, comme les conditions climatériques et la végétation de ces vastes contrées offrent une grande uniformité, il nous semble permis de réunir tous ces objets en un même tableau, qui, en somme, donnera une idée assez juste de la faune de ce pays et fera du moins ressortir les espèces qui y dominent.

En partant de l'Albanie, si l'on suit en sens contraire la route, qu'a parcourue M. Schläfli, on passera par les points suivants, qui lui ont fourni quelques objets: 1) Perespé, près d'un petit lac, dans les montagnes qui séparent l'Albanie de la Rumélie, à 10 lieues de marche de Gördsche; 2) Palanka, petite ville dans le haut de la Macédoine à 49 heures de Perespé; 3) Köstendil (Constantin) 7 heures plus loin, situé dans une large vallée et renommé par ses sources chaudes; 4) Iwortscha (Iswor), habité par des Bulgares mahomédans, à 36 lieues de Köstendil; 5) Loftschia, au milieu d'immenses champs de blé, à 5 lieues vers le NE.; 6) Selwi, jolie ville Bulgare à 6 lieues de Loftschia; 7) Tirnowa, ville de 40000 habitants, 8 lieues à l'Est; 8) Dschuma dans une contrée fertile, à 17 lieues de Tirnowa; enfin 9) la forteresse de Schumla, située à l'extrémité d'une montagne à 5 lieues de Schumla et 18 de Varna. Ce long trajet de 88 lieues de chemin a fourni les espèces suivantes:

1. Zonites hydatinus Rossm.

Palanka, une nouvelle localité à ajouter à celles que nous avons déjà nommées.

2. Helix lucorum Lin.

De Kostendil. Elle paraît occuper une large bande qui de l'Adriatique traverse l'Albanie, la Rumélie et la Thracie jusqu'à Constantinople.

3. Helix pomatia Lin.

Il est parcontre intéressant de rencontrer au Nord du Balkan à Selwi et à Dschuma la vraie *pomatia* avec tous les caractères qu'elle présente dans l'Europe moyenne.

4. Helix fruticum Lin.

Kostendil est le seul endroit d'où M. Schläfli a rapporté cette espèce, si fréquente dans l'Europe moyenne, et qu'on cite de plusieurs points des provinces danubiennes. L'ombilic est assez grand; la forme et la sculpture du test ne diffèrent parcontre pas de la forme typique.

5. Helix frequens Mss.

Prespé, Selwi, Dschuma, Schumla. Elle traverse donc toute la Turquie européenne et ne varie guère que dans sa couleur, tantôt plus claire, tantôt plus foncée et ses dimensions variant de 12 à 15 millim. de diamètre.

6. Helix carthusiana Müll.

Elle est très répandue sans présenter des particularités notables. M. Schläfli l'a recueillie à Iwortscha, à Selwi, à Kostendil, à Loftschia, à Tirnowa, à Dschuma et Schumla. A Selwi elle est un peu globuleuse, à Schumla au contraire un peu plus déprimée que de coutume.

7. *Helix striata* Müll.

Nous suivons à l'égard de cette espèce la distinction qu'a clairement établie M. A. Schmidt (Malac. Blätter 1854, p. 17) entre l'espèce de Müller et celle de Draparnand, la première (*H. costulata* Ziegl.) habitant l'Allemagne et l'Autriche, la seconde, *H. profuga* A. Schm. se répandant dans les plaines de la Lombardie et sur les bords de la Méditerranée. La coquille trouvée à Tirnowa, à Iwortscha, à Selvi et à Dschuma, quatre localités au Nord de la chaîne du Balkan, appartient bien positivement à la première de ces espèces, et non à la seconde. Elle paraît suivre le cours du Danube et s'étendre dans tout le bassin de ces confluent, sans franchir vers le midi les remparts naturels qui le bordent.

8. *Helix cricetorum* Müll. var. *vulgarissima* Schl.

Cette variété qui dans l'Épire était extrêmement fréquente, ne s'est retrouvée qu'à Iwortscha, en Bulgarie, toutefois plus blanche et moins irrégulière. Dans tous les autres lieux domine une forme voisine, que le malacologue exercé rapportera à l'espèce suivante :

9. *Helix obvia* Hartm.

Son ombilic est sensiblement moins évasé, ses tours sont supérieurement moins convexes, même un peu aplatis, sa coloration se distingue par une bande brune sur le dos de la circonférence, le plus souvent unique et interrompue d'espace en espace. Cette espèce s'est trouvée à Iwortscha, à côte de la précédente, puis seule à Tirnowa, Dschuma et Schumla. L'*H. obvia* est encore, comme l'*H. striata* Müll., une espèce qui manque à l'Ouest de l'Europe; elle ne commence qu'en Bavière et sur les confins de la Suisse,

d'où elle se disperse vers l'Est sur toute l'Autriche jusqu'à la mer noire. Les localités précitées rentrent à tout égard dans son domaine.

10. *Helix corcyrensis* Partsch. var. *girva* Friw.

Tandis que dans l'Épire dominaient la forme typique et la var. *canalifera* Ant., on rencontre dans la haute Macédoine et la Bulgarie plutôt, quoique non exclusivement, la var. *girva* Friw. Elle se caractérise par un sommet bombé ou largement conique, par une circonférence presque carénée, une ouverture étroite, rétrécie supérieurement par l'abaissement et l'avancement subit du bord libre à son insertion, et latéralement par une large labiation, qui répond à l'étranglement extérieur du bord. On la trouve ordinairement dépourvue d'épiderme, mais à l'état frais elle est cornée et pilifère. Cette espèce paraît très répandue et paraît remplacer l'*H. obvoluta* M. du Nord. Elle a été recueillie à Perespé, plus grande qu'à l'ordinaire, à Kostendil et à Iwortscha, se rapprochant de la forme typique, enfin à Tirnowa, Dschuma et Schumla avec les caractères bien prononcés et les petites dimensions de l'*H. girva*.

11. *Helix vindobonensis* C. Pfr.

Cette espèce rappelle, quant à sa distribution, l'*H. obvia* Hartm., n'étant connue ni en France, ni en Suisse où l'*H. sylvatica* Drap la remplace. A partir du Danube moyen, elle se répand sur toute l'Europe orientale sur un territoire qui embrasse la Saxe, la Pologne, les provinces danubiennes, la Dalmatie, la Bulgarie, la Russie méridionale jusque dans les provinces transcaucasiennes et ne le cède en rien aux *H. nemoralis* et *hortensis*, qui par contre manquent à la plupart de ces contrées. Presque tout le voyage de

M. Schläfli, à l'exception de l'Épire et des îles ioniennes, tombent dans le domaine de cette espèce; aussi l'a-t-il envoyée de Kostendil, Iwortscha, Loftschia, Selwi, Tirnowa, Dschuma et Schumla et de ces lieux, en partie fort distants les uns des autres, avec des caractères remarquablement constants, ce qui au reste est une particularité de la plupart des espèces du groupe *Archelix* Alb.

12. *Bulimus detritus* Müll.

Cette espèce traverse toute la Bulgarie, sans dévier de la forme typique, comme parcontre s'était le cas dans l'Albanie. M. Schläfli l'a trouvée à Kostendil, à Loftschia, Selwi, Tirnowa et à Schumla. En somme ses dimensions sont un peu plus grandes que dans le Nord. A Tirnowa et Schumla elle se colore élégamment, comme dans la var. *radiatus* de la France.

13. *Chondrus tridens* M. var. *eximius* Rossm.

Tirnowa, Selwi, Dschuma et Schumla. Cette variété qui se distingue par le fort développement des dents, surtout de celle, située sur le bord columellaire (Rossm. Icon. I, N° 305. II, N° 722), et qui dans ses formes extrêmes se rapproche du *H. quinquedentatus* Mhlf., devient, à partir de la Lombardie, à travers l'Illyrie, la Dalmatie, la Bulgarie, en général dans les parties méridionales de son domaine, la forme dominante: Elle est en moyenne plus grande (14^{mm} sur 6) et plus forte que les formes boréales; de Schumla cependant M. Schläfli a envoyé en deux exemplaires une petite variété (10 sur 3½), qui est singulièrement grêle et se rapproche beaucoup du type.

14. *Chondrus microtragus* Parr.

Cette espèce est classique pour les contrées dont nous parlons, en se répandant, quoique étrangère à

d'autres contrées, à travers toute la Rumélie jusqu'aux environs de Constantinople. En Illyrie et dans la Carniole elle manque, d'un autre côté on ne la trouve ni en Crimée, ni dans le Caucase. Prespé est le premier point où M. Schläfli l'a rencontrée. Ensuite il l'a recueillie à Loftschia, Selwi, Tirnowa, Dschuma et Schumla, vivant partout en quantité avec le *Ch. tridens* var. *eximius*, sans jamais se confondre avec lui. Le *Ch. microtragus* (Rossm. Icon. II, N° 651 et Küst. Pupa. p. 62, T. 8, f. 9, 10) est en somme plus petit, plus renflé et contracté et se caractérise surtout par son bord basal muni d'une labiation rectiligne, flanquée des deux côtés symétriquement par une dent latérale pointue.

15. Chondrus seductilis Ziegl.

Quoique bien moins fréquente que les deux précédentes, cette espèce, recueillie à Tirnowa, Dschuma et Schumla, est encore de celles qui appartiennent essentiellement au sud-est de l'Europe. A l'ouest de la Dalmatie on ne la connaît plus. Elle appartient du reste au groupe sénestre du *Ch. quadridens* Müll. et se distingue de ce dernier par l'absence des deux dents columellaires (Rossm. Icon. II, N° 724 et Küst. Pupa. p. 27, T. 3, f. 24—27).

16. Pupa avena Drap.

Cette espèce, citée pour Ianina, s'est retrouvée près de Tirnowa, presque identique avec la forme de la France et de l'Allemagne. Seulement la couleur est un peu plus brunâtre.

17. Clausilia plicata Drap. var. *transylvanica* Parr.

Les belles espèces de Clausilies, qui peuplaient l'Épire, paraissent toutes manquer à la Bulgarie et faire place à des formes qui rappellent bien plus les

types du Nord. M. Schläfli a recueilli à Tirnowa une espèce qui par sa costulation à stigmates blancs, par son ouverture allongée, à bord extérieur muni de plis, à la vérité peu prononcés, par son pli pariétal unique, le moyen des trois que présente ce groupé, enfin par son canal basal répondant à une crête principale de la nuque, rentre dans le domaine de la *C. plicata* Dr. et correspond à la variété, nommée par M. Parreiss var. *transylvanica*. Elle est plus petite que le type, 8^{mm} seulement, moins élancée, n'a que le pli moyen pariétal bien développé, que de faibles plis au bord libre et à peine des indices au bord columellaire.

18. *Clausilia cana* Held.

De Tirnowa et de Dschuma. Cette espèce, nommée par M. Parreiss *C. tessellata* (A. Schmidt. Zeitschr. f. d. ges. Naturw. 1853 p. 1) appartient au même groupe que la précédente et lui ressemble sous la plupart des rapports, de sorte qu'à Tirnowa, où les deux se mêlent, il est difficile de les séparer. Les caractères différentiels sont: l'absence des plis à la circonférence et la présence de deux plis pariétaux bien marqués, le premier parallèle à la suture et le troisième, suivant le bord du canal basal, tandis que dans la *C. plicata* c'est le troisième qui domine. La forme de Dschuma a le flanc de l'ouverture à l'extérieur un peu plus impressionné que le type de la Bavière.

19. *Clausilia intricata* Friw.

Cette troisième espèce de *Loftschia* est encore voisine des précédentes, mais se rapproche le plus de la *C. frandigera* Parr. (Rossm. Icon. II, N° 622), dont peut-être elle n'est qu'une variété. Toutes deux se distinguent des précédentes par la présence à l'ex-

térieur de la nuque de deux crêtes obtuses, au lieu d'une, dont l'une toutefois domine sur l'autre, et qui bordent une rigole assez étendue. Le flanc extérieur de l'ouverture est un peu enfoncé entre deux gibborités, l'une suturale, l'autre formée par la petite crête, toutefois pas autant que dans la *C. bulgarensis* Friw. Ordinairement on observe des traces des trois plis pariétaux du groupe, ils sont cependant peu développés, le second et le troisième souvent même à peine apparents. La costulation sensiblement plus fine et plus aiguë, le test plus mince, la couleur presque uniforme et cendrée la distinguent provisoirement de la *fraudigera*. Ces deux espèces, ainsi que les *C. cana* Held, *C. vetusta* Ziegl. (Rssm. Icon. I, N° 260), *C. socialis* Friw. (Pfr. Mon. II, p. 471), *fritillaria* Friw. (Rossm. Icon. II, N° 623) et *pagana* Ziegl. (Rossm. Icon. II, N° 701), qu'on cite toutes des mêmes contrées de la Turquie, forment encore un ensemble bien difficile à débrouiller, sans de nouvelles données sur la distribution et les rapports des espèces qui le composent.

20. *Clausilia auriformis* Mss.

T. rimata, gracili-fusiformis, lævigata, nitida, subpellucida, griseo-cornea. Spira summo acutiusculo, sutura simplici. Anfr. 11-12, plani, primi convexiusculi, ultimus ad cervicem depresso-rotundatam striatus. Apertura inverse auriformis, lamellis validis perangustata; supera fere horizontali, valde incrassata in marginem non producta; infera verticali patente; lunula nulla; plicis palatalibus 3, prima longiori tenui, secunda brevi vix perspicua, tertia subverticali immersa. Perist. continuum breviter solutum, late reflexum et expansum, intus crasse albo-labiatum.

Long. 17. *Latit.* 3 mm.

Apert. alt. 4,0, *latit.* 3,1 m.

Cette espèce provenant d'Iwortscha est proche parente de l'espèce transylvanique *C. marginata* Ziegl. (Rossm. I, N° 107 et II, N° 626. Pfeiff. Mon. II, p. 400) dont M. Rossmassler décrit une grande variété provenant suivant M. Friwaldsky également de la Turquie. De même que dans tout le groupe, auquel appartiennent ces espèces, la lunule manque entièrement, le Clausilium est fortement incisé, la lamelle supérieure très élevée, enfin la nuque largement arrondie. La séparation de notre espèce de la *C. marginata* repose sur les différences suivantes: la forme est plus élancée, les tours sont moins convexes, la nuque est plus déprimée, l'ouverture plus allongée et auriforme, le bord, fortement labié à l'intérieur, très-dilaté, mais non marginé, la lamelle supérieure remarquablement proéminente et fort épaissie.

21. *Cyclostoma elegans* Lam.

De Schumla et de Dschuma. Conforme au type.

22. *Cyclostoma costulatum* Ziegl.

Recueillie à Iwortscha et à Tirnowa. J'avoue qu'après avoir rassemblé des échantillons de 13 localités bien authentiques, qui me parvinrent soit sous le nom de *C. costulatum* Ziegl. (Rossm. Icon. I, N° 395. Chemn. Ed. II, T. 9, f. 6—8), soit sous celui de *C. glaucum* Sow., je ne suis pas en état de distinguer ces deux formes, tandis que l'espèce plus grande de la Syrie, la *C. Olivieri* Sow., s'en sépare très-naturellement par sa suture recouverte et son opercule paucispire (Pfr. Mon. Pneumonop. Suppl. I, p. 122. Chemn. Ed. II, T. 21, f. 20, 21). La couleur dans les échantillons de la Transcaucasie, aussi bien que dans ceux de

Bulgarie et de la Hongrie, varie par toutes les nuances du bleu cendré au cendré-jaunâtre; la costulation est tantôt uniforme, tantôt inégale, tantôt croisée par des stries d'accroissement aiguës; la suture souvent est simplement enfoncée, d'autres fois faiblement creusée en gouttière. A la vérité je n'ai aucun échantillon aussi élevé et à opercule aussi peu enroulé que le présente la figure de M. Pfeiffer (Chemn. Ed. II, T. 9, f. 3—5). Les bords de la Mer-Noire sont la vraie patrie de cette espèce, qui de là se répond à l'Est et à l'Ouest dans l'intérieur des terres en empiétant sans transition de forme sur le domaine du *C. elegans*.

23. *Limnæus truncatulus* Müll.

De Palanka. Il est un peu plus élancé que la forme la plus commune dans le Nord, mais ne sort pas du cadre des variétés, que l'espèce de Müller présente d'une localité à l'autre. La même forme se trouve selon M. Heldreich dans l'Attique.

24. *Limnæus vulgaris* C. Pfr.

Identique avec ceux de *Ianina*.

25. *Dreissena polymorpha* Pallas.

Elle se trouve dans le lac de Prespé, qui n'est ni en rapport avec l'Adriatique, ni avec le lac de *Ianina*.

En résumé, la faune malacologique de la Bulgarie se compose des éléments suivants: 1) Espèces européennes ou généralement répandues: *Helix pomatia*, *fruticum*, *carthusiana*, *ericetorum*; *Bulimus detritus*; *Pupa avena*; *Clausilia plicata*; *Cyclostoma elegans*; *Limnæus truncatulus*. — 2) Espèces qui suivent presque tout le bassin du Danube, mais manquent à l'Europe occidentale:

Helix vindobonensis, *striata*, *obvia*; *Clausilia cana*. — 3) Espèces du midi de l'Europe, se continuant les unes à l'Ouest les autres vers l'Est: *Zonites hydatinus*, *Helix lucorum*, *frequens*; *Chondrus eximius*, *seductilis*; *Cyclostoma costulatum*; *Dreissena polymorpha*. — 4) Espèces restreintes, à ce qu'il paraît, à cette partie de la Turquie: *Helix girva*; *Chondrus microtragus*; *Clausilia intricata*, *auriformis*. A juger exactement, chaque espèce a son domaine spécial, ainsi que ses habitudes particulières, et ce n'est qu'en embrassant des contrées étendues qu'il devient possible d'en réunir plusieurs en groupes géographiques.

Pour contribuer enfin à la composition d'un tableau complet de la faune malacologiques turque, nous allons réunir en une seule liste toutes les espèces que M. Schläfli a recueillies entre l'Adriatique et la Mer-Noire, en indiquant leur plus ou moins grande fréquence par les chiffres 3, 2, 1.

Espèces.	Littoral de l'Épire.			Plateau de l'Épire.				La haute Rumélie et la Bulgarie.								
	Sayas.	Prévésa.	Pentapigadia.	Sziza.	Ianina.	Leskowik.	Gördsche.	Préspé.	Palanka.	Köstendil.	Iwortscha.	Loftschia.	Selwi.	Timowa.	Dschuma.	Schumlia.
<i>Vitrina pellucida</i> Müll.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Zonites glaber</i> Stud. v. <i>nitidissimus</i> Parr.	—	—	—	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
* » <i>croaticus</i> Partsch. v. <i>transiens</i> Mss.	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» <i>bydatinus</i> Rossm.	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
<i>Helix pomatia</i> Lin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—
* » <i>Schläflii</i> Mss.	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» <i>lucorum</i> Müll.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
» <i>ambigua</i> Parr.	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» <i>aspersa</i> Müll.	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
* » <i>subzonata</i> Mss.	—	—	2	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» <i>corcyrensis</i> Partsch. <i>typica</i>	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
* » » v. <i>octogyrata</i> Mss.	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» » v. <i>canalifera</i> Ant.	3	—	2	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—
» » v. <i>girva</i> Friw.	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	2	—	2	2	2	—
» <i>carthusiana</i> Müll.	3	3	—	3	3	3	—	—	—	2	3	3	2	2	3	2
* » <i>frequens</i> Mss.	—	1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—
» <i>Olivieri</i> Fer.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» <i>fruticum</i> Lin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
* » <i>sericea</i> Drap. v. <i>epirotica</i> Mss.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» <i>pulchella</i> Müll.	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Espèces.	Littoral de l'Épire.			Plateau de l'Épire.				La haute Rumélie et la Bulgarie.								
	Sayades.	Prévésa.	Pentapigadia.	Sziza.	Ianina.	Leskowik.	Görsche.	Prespé.	Palanka.	Köstendil.	Iwortscha.	Loftschia.	Selwi.	Tirnowa.	Dschuma.	Schumla.
<i>Helix pisana</i> Müll.	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» <i>variéata</i> Friw.	2	2	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» <i>striata</i> Müll.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	3	2	—
» <i>apicina</i> Lam.	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
* » <i>ericetrum</i> Müll. v. <i>vulgarissima</i> Schl.	—	—	—	3	3	2	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—
» <i>obvia</i> Hartm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3	3	3
» <i>conica</i> Drap.	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» <i>vindobonensis</i> C. Pfr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	2	2	2
<i>Bulimus detritus</i> Müll.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» » v. <i>tumidus</i> Parr.	—	—	—	—	—	2	2	—	—	1	1	2	—	3	—	3
» <i>acutus</i> Müll.	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Chondrus pupa</i> Linn.	3	2	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» <i>tridens</i> Müll. v. <i>eximius</i> Rssm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	1	3
» <i>microtragus</i> Parr.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	3	3	3	3
» <i>seductilis</i> Ziegl.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	2	3
<i>Pupa avena</i> Drap.	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
* » <i>Philippii</i> Cantr. v. <i>exigua</i> Mss.	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
* » <i>minutissima</i> Hartm. v. <i>obscura</i> Mss.	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
* <i>Clausilia auriformis</i> Mss.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
» <i>plicata</i> Drap. v. <i>transylvanica</i> Parr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—

