

**Plicatularum sex novae,**  
e stratis Aegyptiae parisiensis,  
auctore

**C. Mayer-Eymar, Prof.**

Mars 1890.

Significant: (1) rarissimum; (2) rarum; (3) non rarum; (4) frequens  
et (5) abundans.

E radice nobis adhuc ignota.

**Plicatula abundans**, May.-Eym.

1855. Plicatula polymorpha, Bell., in Mem. Acad. Tor., ser. 2, vol. 15, p. 197 (p. p.), t. 3, f. 8—10 (non 11).

Pl. testa irregulariter ovato-rotundata, fere recta, leviter compressa, valvis aequaliter convexis, crassulis; costis trinis vel quatinis, latis, planis vel plano-convexis, stria marginatis; intersticiis paulo latioribus, plano-convexis, sicut costae striis incrementi densis, sublamellosis et undosis striisque radiantibus tenuissimis, superficialibus, ex toto obductis; auriculis validiusculis, lamellosis, obtuse angulatis, postica majore; dentibus cardinalibus crassis, distantiusculis; cicatricula muscoli subcirculari, laterali; valva sinistra intus prope margines subregulariter paucidentata; marginibus undulatis. — Long. 40, lat. 40 millim.

Parisianum I, d: Wadi Hof prope Heluan (2) Mus. Tur.

Parisianum II, a: Regio submontana septemtrionalis montis Mokattam (3—4) Mus. Tur.; II, b: Ubique

prope Cairo (5). Mus. Mon., Taur. et Tur.; Regio ad occidentem lagi El Querun spectans (4) Mus. Tur.; II, c: Wadi el Tih (2) Mus. Tur.

E serie Plicatulae Beaumonti.

**Plicatula Bellardii**, May.-Eym.

1855. Plicatula polymorpha, Bell., loco cit. (p. p.), t. 3, f. 11 (non 8—10).

Pl. testa ovato-rotundata, subrecta, leviter arcuata, compressa, valvis aequaliter plano-convexis, solidulis; costis senis vel septenis, crassis, fornicato-subtriangularibus, arcuatis, irregulariter lamelloso-tegularis, interdum sub-spinosis; intersticiis angustioribus, concavis, quomodo costae striis radiantibus, tenuibus, densis, superficialibus, ex toto obductis; latere superiore angustato; auriculis parvis, obtuse angulatis, postice paulo majore; dentibus cardinalibus valvae sinistrae distantibus; cicatricula musculi sub-circulari, leviter transversa, laterali; marginibus undulatis. — Long. 33, lat. 30 millim.

Parisiense I, d: Wadi Hof prope Heluan (1) Mus. Tur.

Parisiense II, a: Mokattam (3) Mus. Tur.; II, b: Mokattam (3), Wadi el Tih (4—5) Mus. Taur. et Tur.

E serie Plicatulae Parisiensis.

**Plicatula Cairensis**, May.-Eym.

Pl. testa subovata, longiuscula, recta, compressa, sub-aequilaterali, tenuiuscula; valvis aequalibus, plano-convexis; costis duodecim, validiusculis, fornicato-triangularibus, irregulariter tegulari-asperis, interdum divaricatis, radiatim leviter striato-granulosis; intersticiis linearibus; auriculis majusculis, paucicostulatis, postica majore, sub-

quadrata; margine antico subtruncato, superiore angusto, truncato, inferiore valde arcuato. — Long. 23, lat. 18 millim.

Parisianum II, b: Wadi el Tih (2) Mus. Tur.

**Plicatula Nachtigali**, May.-Eym.

Pl. testa ovato-angusta, subrecta, leviter arcuata, umbonem versus sensim angustata, valde compressa, solidula; valva dextra umbone adnata, convexiuscula, costis quinque, crassis, fornicato-subtriangularibus, irregulariter rugoso-imbricatis, saepe nodoso-spinosis; intersticiis linearibus; valva sinistra fere plana, costis principalibus quinque, crassis, elevatis, triangularibus, irregulariter nodoso-spinosis, costulis posticis quatuor, transversalibus; intersticiis linearibus; auriculis parvis, obtusis, postica majore; cicatricula muscoli subcirculari, laterali; marginibus lateralibus profunde dentatis, margine inferiore arcuato, undulato. — Long. 20, lat. 15 millim.

Parisianum II, b: Wadi el Tih (2) Mus. Tur.

E serie *Plicatulae condyli*.

**Plicatula indigena**, May.-Eym.

*Plicatula polymorpha*, Bell., loco cit. (p. p.).

Pl. testa subquadrata vel subrotunda, raro subovata, recta, compressa, aequivalvi, fere aequilaterali, tenuiuscula; costis decem ad duodecim, fornicatis, validiusculis, plerumque flexuosis, irregulariter sulcato-subnodosis, interdum spinosis, raro dichotomis; intersticiis costis paulo minoribus, plano-concavis; superficie striis radiantibus, levibus, ex toto obducta; auricula postica majuscula; margine superiore truncato, inferiore lato, paulum arcuato. — Long. 20, lat. 20 millim.

Parisianum I, d: Wadi el Tih (2), Heluan (2—1) Mus. Tur.

Parisianum II, b: Wadi el Tih (2—3) Mus. Taur.  
et Tur.

E serie Plicatulae Carteroni.

**Plicatula simulans**, May.-Eym.

Pl. testa ovato-rotundata, obliqua, arcuata, compressa, tenui; valva sinistra plana, costis septem, depresso-subtriangularibus, plerumque rectis, posticis prope marginem incurvis, irregulariter paucispinis; intersticiis concavis; auriculis parvulis; cardine angusto; latere antico valde arcuato, postico concavo. — Long. 22, lat. 20 millim.

Parisianum II, c: Wadi el Tih (1) Mus. Tur.

---

### **Mokattamia,**

Molluscorum pelecypodorum genus novum,  
e familia Crassatellidium,

auctore

**C. Mayer-Eymar**, Prof.

Mars 1890.

---

Characteres generis: Testa aequivalvis, ovalis vel ovato-rotundata, compressa, valde inaequilateralis, solidula, postice angulo obtuso divisa compressiorque; umbones tenuiusculi, obtusiusculi; lamina cardinalis dentibus tribus? tenuiusculis? divergentibus; fossula ligamenti prae-longa, latiuscula; cicatriculae muscutorum superficiales, postica magna, margini palliari propior quam cardinali; superficies costellis radiantibus numerosissimis, filiformibus, undulatis et granulosis, ornata; margines intus laeves.

Hoc genus, generi *Ptychomya*, Ag. (*Pictet*, *S<sup>te</sup> Croix*, III, p. 350), e stratis neocomianis, proximum, ab illo